



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۰/۲۳۳۰۰
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها
مقام معظم رهبری

معاون محترم بهداشت دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: به روز رسانی واکسیناسیون خانم های باردار و شیرده علیه کووید-۱۹

با سلام و احترام

ضمن تاکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق جهت تقویت واکسیناسیون مادران باردار نامه شماره ۳۰۰/۲۳۰۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ با توجه به مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و کمیته ملی واکسن کووید-۱۹ و کمیته کشوری سلامت مادران، موارد ذیل در خصوص واکسیناسیون کووید-۱۹ در دوران بارداری و شیردهی اعلام می شوند:

- در خانم های باردار با سن زیر ۱۸ سال از شروع بارداری تا هفته ۳۹ بارداری، واکسن سینوفارم قابل توصیه است.
 - تزریق واکسن آسترانکا به عنوان دز اول در بارداری توصیه نمی شود و صرفا در صورت اصرار مادر باردار و یا شرایطی خاص (مانند مسافرت خارج کشور)، در صورت تایید کمیته دانشگاهی و پس از اخذ رضایت کتبی، از سن ۱۸ سال به بالا و از شروع بارداری تا هفته ۳۹ بارداری قابل انجام است.
 - در دوران پس از زایمان توصیه می شود واکسیناسیون تا ۱۵-۱۰ روز پس از زایمان (مراقبت دوم) به تعویق افتد.
 - در دوران شیردهی، واکسیناسیون از روز دهم تا پانزدهم پس از زایمان (مراقبت دوم) با یکی از دو واکسن بهارات بیوتک (در سن بالای ۱۸ سال) و یا سینوفارم (تمامی مادران زایمان کرده در همه گروه های سنی) قابل انجام است.
 - واکسیناسیون دوز بوستر، در مادران باردار و پس از زایمان و دوران شیردهی، مطابق دستورعمل های ابلاغی جهت جمعیت عمومی، ولی با واکسن های مجاز در این دوران خواهد بود.
- خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به کلیه مراکز تحت پوشش آن معاونت محترم ابلاغ شود.

دکتر کمال حیدری
معاون بهداشت